

Retoblock®

Καολίνης με
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες



Διαβάστε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φυλάξτε το φύλλο οδηγιών, μπορεί να χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της διάρροιας.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

1 φακελάκος κοκκίων μίας δόσεως (SACHETS) περιέχει 3g καολίνη.

Έκδοχα: φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, πολυβινυλοπυρρολιδόνη, άρωμα μπανάνας, μαλτοδεξτρίνη, σουκραλόζη, διοξειδίο του πυριτίου.

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η συσκευασία περιέχει 14 φακελάκους κοκκίων για πόσιμο εναιώρημα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

FINEFOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.p.A.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Win Medica A.E.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 7488821

www.winmedica.gr

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Τα κοκκία περιέχουν καολίνη.

Ο καολίνης είναι ένας άργιλος ο οποίος έχει ιδιότητες προσρόφησης χάρη στη δομή και την ανόργανη σύνθεσή του. Κατά συνέπεια τα υγρά και άλλες δυνητικά επιβλαβείς ουσίες (π.χ. βακτήρια και εντεροτοξίνες) απορροφώνται μηχανικά, περικλείονται εντός και τα κόπρανα αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή. Ο καολίνης σε περίπτωση διάρροιας, βοηθά στην αύξηση της συνοχής των κοπράνων σε διάστημα 24 και 48 ωρών.

Το προϊόν περιέχει φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS). Χάρη στα χαρακτηριστικά τους οι FOS προάγουν την ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας σε ασθενείς με διάρροια.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.

Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση σε ασθενείς με γαστρικές ή εντερικές βλάβες ή/και ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα, απόφραξη του εντέρου ή εντερικό ερεθισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Ρωτήστε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση σε περίπτωση διάρροιας συνοδευόμενης από πυρετό, αίμα στα κόπρανα ή σε περιπτώσεις όπου η διάρροια διαρκεί πάνω από 2 ημέρες. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν για περισσότερο από 2 ημέρες. Συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε παιδιά κάτω των 3 ετών. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ιατρού κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν περιέχει καολίνη, ένα φυσικό άργιλο από ένυδρο πυριτικό άργιλο. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σε περίπτωση που παίρνετε άλλα προϊόντα που περιέχουν άλατα αργιλίου.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ:

Το προϊόν θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 3 ώρες πριν ή μετά τη λήψη άλλων φαρμάκων.

Ο καολίνης, λόγω των προσροφητικών ιδιοτήτων μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη γαστρεντερική απορρόφηση διαφόρων φαρμάκων με επακόλουθη μείωση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητάς τους.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, εκτός εάν έχετε διαφορετική σύσταση από τον ιατρό.

Είναι σημαντικό να τηρηθούν και να ακολουθηθούν οι οδηγίες χρήσης, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό.

- Ενήλικες: από 2 έως 4 φακελάκους την ημέρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα για 24 ώρες.

- Παιδιά μεταξύ 3 και 12 ετών: 1 φακελάκος την ημέρα.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών.

Εάν το παιδί σας είναι ηλικίας κάτω των 3 ετών, ζητήστε τη συμβουλή του ιατρού σας.

Αδειάστε τα κοκκία σε ένα ποτήρι νερό (200 ml). Ανακατέψτε καλά πριν τη λήψη.

Η διάρκεια της αγωγής εξαρτάται από την ίδια την κατάσταση και την ανταπόκριση στην αγωγή. Ωστόσο, συνιστάται η επικοινωνία με τον ιατρό σας σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν.

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:

Δεν υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις υπερδοσολογίας κατά τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Στη περίπτωση λήψης υπερβολικής δόσης του προϊόντος, επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν κυρίως τη γαστρεντερική οδό. Μπορεί να προκαλέσει μετεωρισμό, διάταση κοιλίας, δυσκολιότητα και ναυτία που συνήθως εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συνιστάται να επικοινωνήσετε αμέσως με τον ιατρό σας σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος είναι τυπωμένη πάνω στο φακελάκο. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή καταστραφεί. Το προϊόν περιέχει φακελάκους μιας χρήσεως. Μην ξαναχρησιμοποιείτε φακελάκους μερικώς χρησιμοποιημένους.

Να φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Να φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Αποφύγετε την απόρριψή του στο περιβάλλον.

Πληροφορίες ενημέρωσης:

03/2016

CE 0426



FINEFOODS & PHARMACEUTICALS NTM S.p.A.
Via Berlino 39 - 24040 Zingonia Verdelino (BG) - ITALY



Μιας χρήσης